



## CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA LE COSCE, I GLUTEI E LA PANCIA

### L'INTERVENTO

- ◆ Il Chirurgo plastico agisce asportando l'eccesso cutaneo o cutaneo-adiposo che si è accumulato nel basso ventre, facendo una plastica muscolo-fasciale, eseguita solo in caso di debolezza della parete muscolare sottostante, e trasponendo l'ombelico.
- ◆ Viene eseguito in anestesia generale e richiede quindi il soggiorno della paziente in clinica per una notte.
- ◆ Ha una durata di circa due ore.
- ◆ La cicatrice residua dell'intervento è situata appena al di sopra del pube e dell'inguine, ma viene completamente coperta dagli indumenti intimi o dal costume da bagno.
- ◆ La paziente, dall'immediato post-operatorio per tre - quattro settimane, deve indossare giorno e notte una guaina elastica per favorire l'accollamento dei tessuti e per evitare trazioni sulle cicatrici, facilitandone quindi il processo di consolidamento.



ADDOMINOPLASTICA



## C.I.D.I.M.U. S.p.A.

10128 TORINO - Via Legnano 23  
Tel: 011 5616111 Fax: 011 5623367  
E-mail: info@cidimu.it  
Sito Web: www.cidimu.it

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA Le cosce, i glutei, e la pancia - Dr. A. RIVOLIN CIDIMU S.p.A.

# CIDIMU S.p.A.



## CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA

### LE COSCE, I GLUTEI E LA PANCIA

### LA LIPOSUZIONE

#### IL GRASSO

- ◆ Spesso sia l'attività fisica sia una corretta alimentazione non sono sufficienti ad eliminare quei circoscritti e fastidiosi accumuli di grasso che appesantiscono e deformano le cosce, i glutei, i fianchi e l'addome.


#### L'INTERVENTO

- ◆ Il Chirurgo Plastico aspira con cannule apposite il grasso in eccesso e ridà quindi una migliore armonia al contorno corporeo.
- ◆ Si svolge solitamente in anestesia locale con l'associazione di un'eventuale sedazione da parte dell'anestesista.
- ◆ Dura circa un'ora - un'ora e mezza e non richiede una degenza in clinica.
- ◆ Le incisioni cutanee attraverso cui sono introdotte le cannule di aspirazione hanno una lunghezza di pochi millimetri.
- ◆ Nel post-operatorio e per un periodo di un mese, la paziente deve indossare una guaina elastica per modellare le aree trattate e per prevenire la formazione di ematomi.
- ◆ A patto di un costante controllo del peso corporeo il risultato è stabile e definitivo e le pazienti si mostrano in genere molto soddisfatte del risultato.



LIPOSUZIONE

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA - Dr. A. RIVOLIN



## IL BODY-LIFT LA PELLE



- ◆ In alcune pazienti, che hanno perso parecchi chili, gli esiti sono rappresentati da flaccidità e lassità cutanee localizzate prevalentemente a carico dei fianchi, dei glutei e della parte esterna delle cosce.
- ◆ A livello della faccia esterna delle cosce si verifica uno svuotamento della pelle ed una sua caduta verso il basso.
- ◆ Lo stesso accade a carico dei glutei, che subiscono un abbassamento della linea interglutea ed un appiattimento della loro superficie.

## L'INTERVENTO

- ◆ E' abbastanza impegnativo per il paziente, non solo per la sua durata, ma in quanto è cospicua la quantità di pelle eliminata ed assai ampio lo scollamento dei tessuti.
- ◆ Consiste nell'asportazione dell'eccesso cutaneo o cutaneo-adiposo che si è accumulato sui fianchi e sulla faccia laterale delle cosce e nel lifting e riempimento dei glutei.
- ◆ Viene eseguito in anestesia generale ed ha una durata variabile da quattro a cinque ore, richiede un ricovero di due o tre notti ed una convalescenza di tre, quattro settimane.
- ◆ Nel post-operatorio la paziente deve portare una guaina contenitiva per tre, quattro settimane, che serve a far aderire nel modo più uniforme i tessuti scollati alla superficie sottostante e ridurre al minimo la trazione sulle cicatrici, che si verifica soprattutto nelle prime settimane.
- ◆ La cicatrice residua dell'intervento è situata posteriormente appena al disopra dei glutei e lateralmente a livello della cresta iliaca, ma viene completamente coperta dagli indumenti intimi e dal costume da bagno.



BODY LIFT



BODY LIFT + ADDOMINOPLASTICA

## L'ADDOMINOPLASTICA

### ADDOME

- ◆ Le deformità della pancia sono dovute o ad un eccesso di pelle e di grasso o ad un solo esubero di pelle, associati spesso a lassità dei muscoli sottostanti. Le principali cause sono la gravidanza, causa di distensione e stiramento prolungato della pelle, e l'eccessiva e repentina perdita di peso.